

# Algasco



1L	5-20 L	120 L	1000 L

## COMPOSIZIONE / COMPOSITION

seaweed  
extracts  
20%



### ESTRATTO DI ALGHE MARINE

#### CARATTERISTICHE

Algasco è un promotore di crescita costituito dal 20% di alghe (*Ascophyllum nodosum*), estratte a freddo mediante un processo enzimatico, che consente a acidi, polisaccaridi e altre sostanze naturali attive di mantenere intatte tutte le loro caratteristiche.

Tali sostanze hanno un **effetto biostimolante** in grado di migliorare la crescita delle piante, il superamento degli stress e lo sviluppo radicale. Algasco consente inoltre di migliorare: l'equilibrio tra fase vegetativa e fase riproduttiva; la produttività delle piante; **le dimensioni, l'uniformità e le caratteristiche qualitative dei frutti** (contenuto zuccherino, colore, consistenza, sorbevolezza).

#### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 0.55 mS/cm | pH 4.15 | pH 1:100 6.6 | Dens. 1.1 g/cm<sup>3</sup>.



### SEAWEED EXTRACT

#### CHARACTERISTICS

Algasco is a growth promoter made up of 20% seaweeds (*Ascophyllum nodosum*), cold-pressed through an enzymatic process, allowing acids, polysaccharides and other natural active substances to keep their characteristics.

Such substances have a **biostimulant effect** able to improve: plants growth, resistance against stress and root development.

Algasco provides many benefits, in particular: vegetal and reproductive balance; plants productivity; size, uniformity and qualitative characteristics of fruits (sugar content, colour, texture, tastefulness).

#### CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES

EC 1:100 0.55 mS/cm | pH 4.15 | pH 1:100 6.6 | Dens. 1.1 g/cm<sup>3</sup>.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS	MODALITÀ D'IMPIEGO / METHODS OF USE	ml/l	l/ha
	<b>3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva.</b> 3 applications: flower buds, after fruit setting and olive growth.	1 - 2	8 - 10
	<b>5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento acini e 4 settimane prima della vendemmia.</b> / 5 applications: sprouting, pre-flowering, fruit setting, grape growth and 4 weeks before harvesting.	1 - 2	8 - 10
	<b>4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti e dopo 20 gg dalla precedente.</b> / 4 applications: flower buds, after fruit setting, fruit growth and 20 days after the previous application.	1 - 2	8 - 10
	<b>3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto.</b> 3 - 4 applications: starting from 8 - 10 days post-transplanting.	1 - 2	8 - 10

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / For a water volume of 1000 l/ha.

Anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili. / Also mixed with common water-soluble fertilizers.