



# Betamin



1L	5-20 L	120 L	1000 L

## COMPOSIZIONE / COMPOSITION

N org.	Betaine	C org.	K <sub>2</sub> O
2.3%	5%	12%	6%



### PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso. Consentito in agricoltura biologica.

### CARATTERISTICHE

Betamin è un prodotto ad azione specifica a base di **amminoacidi vegetali e alghe**, che favorisce l'attività radicale ed aerea della pianta, l'assorbimento degli elementi nutritivi e l'efficienza fotosintetica.

Il contenuto di betaina aumenta il potenziale osmotico delle cellule vegetali e **riduce gli stress abiotici**, incrementando il risultato qualitativo e quantitativo delle produzioni.

L'applicazione continuata incrementa la sostanza secca di frutti e piante. Betamin è estremamente **efficace in ogni fase fenologica di crescita**, garantendo sempre un equilibrio vegeto riproduttivo.

### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 1.65 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6 | Dens. 1.18 g/cm<sup>3</sup>.



### PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Liquid extract of alfalfa, seaweeds and molasses. Allowed in organic agriculture.

### CHARACTERISTICS

Betamin is a **product with specific action based on amino acids of plant origin with seaweeds**, that improves both root and vegetative development of plants, besides the absorption of nutrients and the photosynthetic efficiency.

The content of betaines increases the osmotic potential of plant cells and **reduces the abiotic stress**, thus improving yields in terms of quality and quantity. Its repeated application increases the dry matter of fruits and plants. Betamin is highly **effective in all the phenological phases of development**, always guaranteeing the vegetal and reproductive balance.

### CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES

EC 1:100 1.65 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6 | Dens. 1.18 g/cm<sup>3</sup>.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS	MODALITÀ D'IMPIEGO / METHODS OF USE	ml/l	l/ha
	<b>2-3 applicazioni: dalla ripresa vegetativa fino a 7 gg. prima del raccolto.</b> 2-3 applications: from vegetative regrowth up to 7 days before harvesting.	2 - 3	10 - 20
	<b>3-4 applicazioni: dal trapianto fino a 7 gg. prima del raccolto.</b> 3-4 applications: from transplanting up to 7 days before harvesting.	2 - 3	10 - 20
	<b>1 applicazione: in post emergenza.</b> 1 application: post-germination.	2 - 3	10 - 20

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / For a water volume of 1000 l/ha.