

Algasco



1L	5-20 L	120 L	1000 L

COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

estratto di
alghe marine
20%



ESTRATTO DI ALGHE MARINE

CARATTERISTICHE

Algasco è un promotore di crescita **costituito dal 20% di alghe (*Ascophyllum nodosum*)**, estratte a freddo mediante un processo enzimatico, che consente a acidi, polisaccaridi e altre sostanze naturali attive di mantenere intatte tutte le loro caratteristiche.

Tali sostanze hanno un **effetto biostimolante** in grado di migliorare la crescita delle piante, il superamento degli stress e lo sviluppo radicale. Algasco consente inoltre di migliorare: l'equilibrio tra fase vegetativa e fase riproduttiva; la produttività delle piante; **le dimensioni, l'uniformità e le caratteristiche qualitative dei frutti** (contenuto zuccherino, colore, consistenza, sorbevolezza).

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 0.55 mS/cm | pH 4.15 | pH 1:100 6.6 | Dens. 1.1 g/cm³.



EXTRACTO DE ALGAS MARINAS

CARACTERÍSTICAS

Algasco es un promotor de crecimiento **constituido al 20% por algas (*Ascophyllum nodosum*)**, extraídas en frío a través de un proceso enzimático, que permite a ácidos, polisacáridos y otras sustancias activas naturales conservar intactas todas sus características.

Dichas sustancias tienen un **efecto bioestimulante** capaz de mejorar el crecimiento de las plantas, la resistencia al estrés y el desarrollo de las raíces.

Además, Algasco favorece los siguientes beneficios: equilibrio vegetativo-reproductivo; productividad de las plantas; **tamaño, uniformidad y calidad de los frutos** (o sea nivel de azúcar, color, textura, sabor).

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 0.55 mS/cm | pH 4.15 | pH 1:100 6.6 | Dens. 1.1 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	ml/l	l/ha
	3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva. 3 aplicaciones: botones florales, después de cuaja y crecimiento de aceitunas.	1 - 2	8 - 10
	5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento acini e 4 settimane prima della vendemmia. / 5 aplicaciones: germinación, pre-floración, cuaja, crecimiento de racimos y 4 semanas antes de la cosecha.	1 - 2	8 - 10
	4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti e dopo 20 gg dalla precedente. / 4 aplicaciones: botones florales, después de cuaja, crecimiento del fruto y 20 días después de la aplicación antecedente.	1 - 2	8 - 10
	3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto. 3 - 4 aplicaciones: 8 - 10 días después del trasplante.	1 - 2	8 - 10

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / Para un volumen de agua de 1000 l/ha.

Anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili. / También mezclado con fertilizantes hidrosolubles comunes.