



Bialga 15

1L	5-20 L	120 L	1000 L

COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

sostanza organica (estratti d'alga)
15%



ESTRATTO DI ALGHE MARINE

CARATTERISTICHE

Bialga 15 è un promotore di crescita costituito dal 15% di alghe marine del genere *Aschophyllum nodosum*, nonché da **fitormoni naturali, enzimi, proteine, vitamine, amminoacidi e polisaccaridi**. Il prodotto migliora l'allegagione, aumenta la resa delle colture, prolunga il periodo di conservabilità dei frutti, migliora la germinazione dei semi, **favorisce lo sviluppo radicale, aumenta la resistenza alle condizioni di stress**, riduce significativamente la degradazione della clorofilla e lo stress salino. È consigliato l'uso di Bialga 15 con fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti, dei quali aumenta l'efficacia facilitandone la traslocazione all'interno della pianta.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 7 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1.1 g/cm³.



EXTRACTO DE ALGAS MARINAS

CARACTERÍSTICAS

Bialga 15 es un promotor de crecimiento constituido al 15% por algas (*Aschophyllum nodosum*) y **fitohormonas naturales, enzimas, proteínas, vitaminas, aminoácidos y polisacáridos**.

Este producto **permite mejorar**: cuaja, rendimiento de los cultivos, conservabilidad del fruto, germinación de las semillas, **desarrollo radical, resistencia a condiciones de estrés**, reducción de la degradación de clorofila y estrés salino.

Se recomienda el uso de Bialga 15 combinado con fertilizantes, agro-fármacos y herbicidas, de los cuales favorece la eficacia y la translocación en las plantas.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 7 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1.1 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	ml/l	l/ha
	3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva. 3 aplicaciones: botones florales, después de cuaja y crecimiento de aceitunas.	3 - 5	8 - 10
	5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento acini e 4 settimane prima della vendemmia. / 5 aplicaciones: germinación, pre-floración, cuaja, crecimiento de racimos y 4 semanas antes de la cosecha.	3 - 4	8 - 10
	4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti e dopo 20 gg dalla precedente. / 4 aplicaciones: botones florales, después de cuaja, crecimiento del fruto y 20 días después de la aplicación antecedente.	3 - 4	8 - 10
	3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto. 3 - 4 aplicaciones: 8 - 10 días después del trasplante.	3 - 4	8 - 10

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / Para un volumen de agua de 1000 l/ha.

Anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili. / También mezclado con fertilizantes hidrosolubles comunes.