



Candock

Equiseto/Equisetum



COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

Estratto di Equiseto / Extracto de Equisetum
(Equisetum arvense L.)
100%



SOSTANZA DI BASE

Estratto acquoso di equiseto stabilizzato.
Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

Candock ha effetti preventivi sulle malattie fungine delle piante. È autorizzato l'utilizzo su alberi da frutto, frutti rossi, orticole e vite. **Stimola i meccanismi di difesa delle piante** grazie al naturale contenuto di silicio e di composti aromatici complessi (sali solforici). Permette alla pianta di migliorare le proprietà organolettiche e la produzione. Candock **contribuisce al controllo delle patologie fungine** se inserito in miscela e/o in strategia a prodotti fitosanitari specifici. Nel controllo delle peronosspore insieme al rame ne migliora le performance e permette il rispetto delle dosi autorizzate anno/ettaro.

PUREZZA

Conforme alla Farmacopea Europea.



SUSTANCIA DE BASE

Extracto acuoso de equisetum estabilizado.
Permitido en agricultura ecológica.

CARACTERÍSTICAS

Candock tiene efectos preventivos contra las enfermedades fúngicas de las plantas. Se autoriza su uso para árboles frutales, frutos rojos, hortalizas y vid. **Estimula los mecanismos de defensa de las plantas** gracias al contenido natural de silicio y compuestos aromáticos complejos (sales sulfúricas). Permite a la planta mejorar sus propiedades organolépticas y la producción. Candock **contribuye al control de las patologías fúngicas** cuando se mezcla y/o en combinación con productos fitosanitarios específicos. Para el control del mildiu, conjuntamente con el cobre, mejora las prestaciones de este último y permite respetar las dosis autorizadas año/hectárea.

PUREZA

De conformidad con la Farmacopea Europea.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	AVVERSITÀ / ENFERMEDAD	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	 ml/l
	<i>Ticchiolatura (Venturia inaequalis)</i> . <i>Oidio (Podosphaera leucotricha)</i> . <i>Bolla (Taphrina deformans)</i> / <i>Moteado (Venturia inaequalis)</i> . <i>Oidio (Podosphaera leucotricha)</i> . <i>Lepra (Taphrina deformans)</i> .	2-6 applicazioni estive: ogni 7 giorni dalla comparsa dei mazzetti fiorali alla caduta dei fiori (BBCH 53-67) / 2-6 aplicaciones de verano: cada 7 días desde la aparición de las inflorescencias hasta la caída de las flores (BBCH 53-67).	2 - 12
	<i>Peronospora (Plasmopara viticola)</i> . <i>Oidio (Erysiphe necator)</i> / <i>Mildiu (Plasmopara viticola)</i> . <i>Oidio (Erysiphe necator)</i>	2-6 applicazioni primaverili-estive: ogni 7 giorni dal primo sviluppo fogliare fino al completo sviluppo delle infiorescenze (BBCH 10-77) / 2-6 aplicaciones de primavera-verano: cada 7 días desde el primer desarrollo foliar hasta el completo desarrollo de las inflorescencias (BBCH 10-77).	2 - 12
	<i>Oidio (Podosphaera xanthii)</i> . <i>Funghi del suolo (Pythium spp.)</i> / <i>Oidio (Podosphaera xanthii)</i> . <i>Hongos del suelo (Pythium spp.)</i>	2 applicazioni: ogni 3-4 giorni dallo stadio di 9 foglie sullo stelo principale fino a 9 o più germogli laterali visibili (BBCH 19-49) / 2 aplicaciones: cada 3-4 días desde la etapa de 9 hojas en el tallo principal hasta 9 o más brotes laterales visibles (BBCH 19-49).	0.4 - 3.6
	<i>Alternaria (Alternaria solani)</i> . <i>Septoria (Septoria lycopersici)</i> / <i>Alternaria (Alternaria solani)</i> <i>Septoriopsis (Septoria lycopersici)</i>	2 applicazioni estive: ogni 14 giorni durante l'emergenza fiorale (BBCH 51-59) / 2 aplicaciones de verano: cada 14 días en germinación floral (BBCH 51-59)	12
	<i>Botrite (Botrytis cinerea)</i> . <i>Oidio (Podosphaera aphanis)</i> . <i>Peronospora (Phytophthora fragariae)</i> . Altri funghi come <i>Colletotrichum acutatum</i> / <i>Moho gris (Botrytis cinerea)</i> . <i>Oidio (Podosphaera aphanis)</i> . <i>Mildiu (Phytophthora fragariae)</i> . Otros hongos como <i>Colletotrichum acutatum</i> .	4-8 applicazioni estive: ogni 5-14 giorni durante l'emergenza fiorale (BBCH 51-59) / 4-8 aplicaciones de verano: cada 5-14 días en germinación floral (BBCH 51-59)	2.5 - 5.4
	<i>Peronospora (Phytophthora infestans)</i> . <i>Marciume nero (Alternaria solani)</i> / <i>Oidio (Erysiphe cichoracearum)</i> / <i>Mildiu (Phytophthora infestans)</i> . <i>Podredumbre negra (Alternaria solani)</i> . <i>Oidio (Erysiphe cichoracearum)</i> .	4-8 applicazioni: ogni 5-14 giorni: BBCH 10-90 / 4-8 aplicaciones: cada 5-14 días (BBCH 10-90).	2.5 - 5.4