



Top Humic



**COMPOSIZIONE (% sostanza secca) /
COMPOSICIÓN (% peso seco)**

C	N org.	Sostanza organica	Sostanza organica estraibile (% sostanza organica)
45%	1%	90%	70%
Sostanza organica umificata (% sostanza organica estraibile)			93%



AMMENDANTE

Leonardite tedesca. Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

Top Humic è un **ammendante granulare** a base di leonardite tedesca, **con acidi umici e fulvici**, che svolge una doppia azione su suolo e pianta. L'applicazione di Top Humic **migliora: l'apparato radicale**, la crescita delle piante, la produzione e la resistenza agli stress (siccità, salinità e sbalzi di temperatura). Inoltre, apporta i seguenti benefici per il suolo: **migliore struttura**, aumento di ritenzione idrica, capacità di scambio cationico (CSC), potere tampone e attività microbiologica.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

pH 4.5.

FORMULAZIONE

Granulare. Dimensione dei granuli Ø 3 - 5 mm.
Peso specifico 0.78 kg/l.



ENMIENDA

Leonardita alemana. Permitido en agricultura ecológica.

CARACTERÍSTICAS

Top Humic es una **enmienda granular** a base de leonardita alemana, **con ácidos húmicos y fúlvicos**, que desarrolla una **doble acción** para plantas y suelo. El uso de Top Humic **mejora: raíces**, crecimiento, producción, resistencia a factores de estrés (sequía, salinidad y oscilaciones de temperatura). Además el producto realiza los siguientes beneficios para el suelo: **mejor estructura**, aumento de la retención hídrica y de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), optimización de la capacidad amortiguadora y aumento de la actividad microbiológica.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

pH 4.5.

FORMULACIÓN

Granular. Tamaño de los microgránulos Ø 3 - 5 mm.
Peso específico 0.78 kg/l.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	
	1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto, ripresa vegetativa. 1 - 2 aplicaciones: pre y/o post-trasplante, reactivación vegetativa.	300 - 400 kg/ha
	1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto. 1 - 2 aplicaciones: pre y/o post-trasplante.	200 - 300 kg/ha
	1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto. 1 - 2 aplicaciones: pre y/o post-trasplante.	20 - 30 kg/100 m ²
	1 applicazione: alla preparazione del substrato in associazione con i fertilizzanti minerali. 1 aplicación: preparación del sustrato, combinado con fertilizantes minerales.	10 kg/m ³ di substrato 10 kg/m ³ sustrato